

개 브루셀라증,

이렇게 예방하세요!

유·사산된 개의
혈액·대소변·양수·태반 등을
다루는 작업을 할 경우



1 개인보호구 착용!



2 청소 및 소독은 필수!

작업 후,
청소 및 소독 실시하기
(염소계 소독제 이용)




사용한 보호구는 폐기,
입었던 옷은 세탁하기




3 철저한 개인위생!

작업 중 상처가 나면
즉시 소독, 밴드 붙이기



작업 후, 목욕하기



임산부, 면역 저하자는
개의 출산 과정에
참여하지 않기




주의

특히, 반려동물과 밀접한 접촉이 많은 직군*은 정기적인
브루셀라증 검사가 필요할 수 있습니다.

* 동물 생산/판매업 종사자, 수의사, 유기동물보호소·동물보호단체
종사자, 실험실 진단기관 종사자, 반려동물관련 전공학생 등

개 브루셀라증

예방 3대 수칙 이렇게!



브루셀라증이란?



브루셀라균이 감염된 동물(소, 염소, 개 등)에서 사람으로 전파되는 **인수공통감염병***입니다.
감염된 개를 통해 사람에게 전염되는 병원체는 **B.canis**입니다.

※ 인수공통감염병: 동물과 사람, 상호 간에 감염되어 발생하는 질병

사람은 개 브루셀라증에 어떻게 감염되나요?

☑ 감염된 개와 직접접촉

출산 또는 유산시 나오는 양수 및 태반, 대소변이나 유즙, 혈액, 침 등이 사람의 피부상처나 결막 등에 직접 노출될 경우

☑ 브루셀라 균의 흡입

사육장(특히 분만장소) 청소 시 발생한 먼지를 흡입할 경우



개 브루셀라증 감염 시 나타나는 증상은?

⊕ 사람에게 나타나는 증상



증상이 없는 경우가 흔하지만, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.


☑ 감염 초기

감염 후 평균 2~4주 내에 **감기유사증상***


* 발열, 오한, 두통, 근육통, 관절통, 식욕저하, 피로감, 체중저하 등

☑ 만성기(증상 1년 이상 지속)

관절통, 신경계 이상 등의 합병증이 발생할 수 있으며, 치료기간이 길어질 수 있습니다.



발열



두통



피로감

⊕ 개에게 나타나는 증상



☑ 암컷의 경우 불임, 유·사산, 수컷의 경우 고환염, 부고환염 등이 나타납니다.

☑ 증상을 보이지 않을 수 있으므로, 검사가 필요 할 수 있습니다.

개 브루셀라증 의심증상 발생 시 어떻게 대처 하나요?


☑ 보호자에게 의심증상이 있다면?

즉시 병원에 방문하여 반드시 최근 활동(개와 접촉 여부), 건강상태 등을 의료진에게 설명해 주세요.

☑ 우리 개가 브루셀라병에 걸렸다면?

보호자도 병원에 방문하여 검사를 받아야 합니다.

※ 관할 보건소에 치료 및 검사의뢰 가능 병원을 문의하세요!



개 브루셀라증에 걸리면 어떻게 치료 하나요?

복합 항생제를 장기복용해야 합니다.(수주~수개월)

* 항생제 종류
독시사이클린과 겐타마이신 또는 독시사이클린과 리팜피신 등



치료 완료 후 **2년간 헌혈을 금지합니다.**

